

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十八

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣張曾秀

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十八 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

子煩 附論

夫妊娠苦煩悶者四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產實云夫妊娠而子煩若是肺臟虛而熱在心則令心煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔

吐涎沫纔聞食氣煩燥不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣鬱不舒或煩燥或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也

方

升麻湯

一名麥門冬湯出聖惠方

治妊娠壅熱心神煩燥口乾渴

逆此證與子煩大同小異通用知母丸亦可

川升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子仁 柴

胡 茯苓 瓜盧根 犀角屑 各一兩 知母 甘草

各半
兩

右呿咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

酸棗仁湯

治妊娠煩惱虛悶四肢疼痛不睡

酸棗仁

炒二兩

芍藥

防風

去

柴胡

去苗

赤茯苓

去皮

犀

角鎊

五味子

甘草

炙

人參

檳榔

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘時

服

赤茯苓散

出聖惠方

治妊娠心煩頭頸疼痛不思飲食手

足多熱

赤茯苓 桑寄生 知母 百合 麥門冬

川升麻 人參 柴胡 甘草

右搗篩為末每服四錢以水一中盞入甜竹茹一分
生姜汁三分薤白七寸煎至六分去滓不拘時候
溫服

退熱湯 治妊娠虛煩懊熱者以陽氣偏甚熱氣獨作
心下懊悶頭痛面赤小便黃澁若淋痛是也病源又

謂之子煩

人參

甘草

黃芩

去黑心
各二兩

當歸

切焙

芍藥

梔子

仁

防風

去義

柴胡

去苗各
一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓食後溫服

柴胡飲

治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩倦

柴胡

去苗

桑寄生

知母

切焙

百合

洗

麥門冬

去心
焙

升

麻

各一兩

甜竹茹

新竹茹

用三兩

右搗篩每服五錢水一盞半生姜三片同煎至一盞

去滓食後溫服

知母丸 治妊娠懊煩虛熱

知母

焙切

防風

去

黃芩

去黑心

甘草

炙

麥門冬

去心焙

赤

茯苓

去黑皮判

升麻

各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎七分入竹

瀝少許攪勻去滓溫服不拘時

茯苓湯 治妊娠虛煩懊熱中心悶亂頭暈重嘔逆四

肢倦怠

赤茯苓

去皮

防風

人參

白朮

剉炒

枳殼

去穰

麩炒

甘草

炙各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服不拘時

竹瀝湯

治妊娠心下煩熱懊躁

防風

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑心

升麻

石膏

剉碎

梔

子仁

各一兩

右搗篩每服三錢水一盞竹瀝半合煎至七分去滓

食後溫服

知母飲

出大金
良方

治妊娠心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤茯苓

黃芩

黃耆

各三
兩

知母

麥門冬

去
心甘

草

各三
兩

右為粗末桑白皮煎湯成入竹瀝一合服不拘時候
治胎臟受熱最宜服之一方去黃耆知母加地骨皮
犀角屑嫩葛各三分㕮咀煎如前法

犀角散

出聖
惠方

治妊娠心煩熱悶

犀角屑 地骨皮 黃芩 麥門冬去心 赤茯苓已上

各二兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不拘時候溫服

竹瀝湯一名竹葉湯出千金方 治妊娠常苦煩悶此是子煩以

四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多所煩悶宜用此方

竹瀝一升亦作竹葉 麥門冬 防風 黃芩各三兩 茯苓四兩

右以水四升加竹瀝煎取二升分三分服不瘥再作一方用知母無黃芩一方加人參半兩

麥門冬湯

一名竹葉湯
出濟生良方

治妊娠四月六月多苦煩膽

怯名曰子煩

白茯苓

去皮
一兩人參

麥門冬

去心防風

各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片入淡竹葉十片煎至八分去滓溫服

茯苓

三兩
兩竹瀝 一升

右以水四升合竹瀝煎取二升分三分服不瘥亦可
時合竹瀝服之

治孕婦七八個月傷暑傷熱以致子煩胎氣迫近於上
咽喉窒礙心腹脹滿下墜似痢每登廁坐時一炊久
忍爾氣下方得大便一通俗率用藥不知病在胎熱
子煩

用小柴胡湯下黃連阿膠丸或用炒阿膠淨黃連
各一分枳殼北大黃半之分作兩劑用烏梅姜兼

蜜服候其大便調導却以川芎茯苓縮砂甘草繼之若五苓散感應丸香連舟車非其治也用竹瀝隨多少時時服之自瘥

治妊娠子煩燥乾不得臥

出大金良方

黃連去鬚為細末每服一錢粥飲調下酒蒸黃連

丸亦可

一母凡

出大金良方

治妊娠因服藥致胎不安有似虛煩

不得安者用知母一兩洗淨為細末以棗肉為丸彈

予大每服一丸細嚼煎人參湯送下 每見醫者不
識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣有識者亦見有
藥也產科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中用之良
驗一方用秦艽糯米湯化下名萬安丸

治妊娠心中煩悶見食嘔吐非時惡心飲食不進脉氣

洪滿大小腑實熱

出楊子建萬全護命方

麥門冬

去心

防風

茯苓

山梔

前胡

去毛

升麻

黃芩 石膏

各等分

右細搗為末每服三錢水一盞半葱三枚煎至六七沸食後臨臥喫

子淋附論

夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則小便行澁而數不宣妊娠之人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也轉胎證候孕婦多有之患在忍縮小便或喜煎炒或胞後為熱所迫遂使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯

外水不能入膀胱內水不能出膀胱淋瀝數急每欲尿時痛不可言大便亦裏急似痢非痢必以手從胸間按至臍下庶可出小便否則逆上出而不禁甚者因此腹脹浮腫治法用涼藥踈則利小腸中熱乃與通大便其腹中攪痛大便大下則溺胞隨即歸正於是小便順流宜服葵子湯

方

地膚大黃湯

出聖惠方

療妊娠患子淋由腎虛膀胱熱則

小便行澁而數不通心中煩悶

川大黃 地膚子兩各三 知母 黃芩 猪苓 赤

芍藥 通草 川升麻 枳實 甘草兩各二

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服不瘥

還飲地膚葵根汁忌海藻菰菜酢物

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心中煩悶不思飲食出聖惠方

瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子兩各一

黃芩 芍藥 枳殼 車前子兩各半

右為粗末每服四錢水一盞煎至六分溫服

又

安榮散

出危氏方

治妊娠小便淋澀蓋小便淋澀者何答

曰本因調攝失宜子臟氣虛又緣酒色過度傷其血脉致水藏澀遂成淋澀名曰子淋宜服安榮散通利小便

麥門冬

去心

通草

滑石

各一錢

當歸

酒浸

燈草

甘草

炙各半兩

人參

細辛

各一錢

右搗篩為細末每服三錢煎麥冬湯調服不拘時候服之尤妙一方只用檳榔赤芍藥各等分水煎空心服屢效或蔥白煎亦可

木通湯 治婦人子淋澀痛

木通

剉石韋 去毛各一兩

赤茯苓

去黑皮

芍藥

桑根白

皮

剉陳橘皮 湯浸去白炒

人參

各三分

右搗篩每服三錢水一盞半入生姜一片棗一枚煎至八分去滓溫服

冬葵子散

聖惠方

治妊娠胎不安小便淋澀小便疼痛

冬葵子

炒

柴胡

去苗

桑根白皮

赤茯苓

各一兩

赤芍

藥 當歸

三錢微炒

右搗為散每服四錢水一中盞煎入生姜半分葱白

七寸同煎至六分去滓不計時候溫服

冬葵子湯

出大方全方

治妊娠患淋小便澀不利小腹熱痛

冬葵子

一升

芍藥

二兩

黃芩

赤茯苓

車前子

各三升

右以咀以水七升煎至七分作三分溫服

海蛤湯 治妊娘子淋

海蛤

木通

剉

豬苓

去黑皮各半兩

冬葵子

微炒一分

右搗篩每服三錢水一盞燈心十莖煎至六分去滓

食前溫服

外滑石

研一分

和前藥調服

當歸湯 治妊娘子淋漓痛煩

當歸

切焙

芍藥

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙剉

梔子仁

各半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服

人參散 治妊娠子淋

人參

木通

剉青鹽

細研以湯一盞化浸前二味一宿焙乾

海金沙

別研各一分

莎草根

去毛二兩

右將人參木通莎草根搗羅為末同海金沙青鹽一

處再研勻每服二錢空心酒或米飲調下

葵子散

出聖惠方

治妊娠小便澀痛謂之子淋

葵子

滑石

木通

榆皮

各等分

右為末每服三錢以水一盞半葱白七寸煎至七分

食前服一方無榆皮

又方

出仁
存方

葵子

滑石

杏仁

寒水石

各等分

右為末或煎或調服神效

白芷散

治妊娠子淋小便頻澀痛

白芷

三分
焙

鬱金

阿膠

炙
燥

滑石

各一
兩

右搗羅為散每服二錢煎蔥白調下

石蠹散

治妊娠子淋日夜頻數澀痛夫婦人懷子而

淋者謂之子淋因腎虛膀胱經客邪熱令溲少而數水道澁痛引於臍下也

石蠟

碎一枚

乳香

一分滑石

一分兩半

右研細為散每服一錢煎燈心湯調下

石葦湯

治姙娠小便頻數澁痛

石葦

去毛

榆白皮

各一兩

滑石

二兩

右搗篩每服三錢水一盞入葱二寸生薑二片煎至六分去滓食前溫服

鯉魚汁

出聖惠方

治妊娠小便淋瀝胎不安

鯉魚

一個重一斤者如食法

葵菜

一斤葱白四兩切

右以五升水煮熟者少許鹽和魚菜并汁同食之效

治妊娠淋小便數而少澁痛手足煩悶

出聖惠方

地膚草 茅根

大麻子

各一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入葱白七寸煎至六分去滓不拘時候溫服

檳榔散

出產經

治胎前諸般淋澁小便不通醫作轉胎

用他藥不愈此方屢神效

檳榔

一枚麪裹
煨熟去麪

赤茯苓

各等分

右為粗末每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服
空心食前尋常男子婦人血淋及小便淋瀝水道疼
痛用之甚效一方治妊娠中惡心腹疔痛溫酒調下
一錢

滑石湯 治妊娠子淋

滑石

二兩研

赤芍藥

剉半兩焙

右搗篩每服五錢水一中盞半煎至八分食前溫服
去滓

治妊娠小便淋瀝臍腹煩悶

出聖惠方

猪苓

一兩去黑皮

蘧麥

一兩

右搗篩為末每服二錢不計時候煎葱白湯調下

車前子湯 治妊娠患淋水道熱不通

車前子

五兩研

葵根

切一升

右以水五升煎取一升半分二服

葵子飲

出大
全方

治妊娠患子淋

以葵子一升水五升煎取二升分再服一方無葵

子用葵根亦可亦治小便不通

甘遂散

出大
全方

療妊娠子淋大小便不利已服猪苓散

不瘥者宜服此藥下之

用太山赤皮甘遂二兩為末以白蜜二合和合如

豆大多則攪心煩得微下者一服下之後還服猪

苓散不得下者日二服漸加至半錢以微利為度

猪苓散

出大
金方

療妊娠小便澁痛兼療胎水亦治子淋

用猪苓五兩去皮為末白湯調方寸匕加至二匕

日三夜三不瘥宜輕下之藥服之則效

地膚湯

大
金方

療妊娠子淋小便數出或熱疼痛酸手

足冷煩及子煩

用地膚草三兩細切水四升煮取二升半去滓分

三服三日夜一方作地膚子十二兩

心腹痛

附論

夫妊娠心腹者或由宿有冷痰或新觸風寒皆由臟虛而致發動也邪正相繫而并於氣隨上下衝心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時瘥者其痛衝心擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又曰妊娠心腹痛疼多是風寒濕冷痰飲與臟氣相擊故令腹痛攻傷不已致胎動也妊娠心痛者多是邪風痰飲乘於心之經絡邪氣搏於正氣交結而痛也若傷心正經而痛者為真心痛心為地主之官統領

諸臟不可受邪邪若傷之朝發夕死夕發朝死若傷心
肢別絡而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠之人或
有病不已者氣乘胞絡傷損子臟也則令胎動凡胎轉
移則多不安不安而動於血者則血下也雷公云心痛
死急覓延胡 妊娠臟腹虛弱冒寒濕之氣邪氣與正
氣相擊故令腹痛病不已則傷胞絡令胎不安治法宜
服散寒諸方安和胎氣則痛自愈

方

保生湯 治妊娠心痛服祛寒散溫和胎氣

紫苑

去華

柴胡

去苗

龍骨

赤石脂

各一兩半

艾葉

炒

白朮

各三分

黃連

去鬚

厚朴

去姜汁炙

生

阿膠

炙令燥

枳殼

去穰炒各

一兩

地榆

一兩

肉苁蓉

去黑心各半兩

益智

去皮

乾姜

旋復花

炒

黃芩

去黑心各半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

澤蘭丸 治妊娠腰冷腹痛不欲食安胎

澤蘭

當歸

切焙

肉桂

去粗皮各二兩

乾姜

炮半兩

芎藭

阿

膠

炙令沸燥

蕪荑

藁本

去苗石羔

研

白芷

栢子仁

人參

白朮

細辛

去苗葉

甘草

炙剉各一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每十五丸溫酒

日再服

沈香湯

治妊娠心痛痰逆不思飲食

沈香

剉一兩

白荳蔻

去皮

草荳蔻

去皮白半兩

白朮

剉炒二兩

人

參

白茯苓

去黑皮各半兩

厚朴

去粗皮生薑汁拌一兩

半夏

半兩切

生薑汁拌炒熟

陳橘皮

湯浸去白炒三分

木香

半兩

乾姜

炮一兩

甘草

炙半
兩

右搗羅每服三錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分去滓稍熱食前服

七寶湯 治妊娠心痛胸腕不利嘔吐冷痰

半夏

半兩生薑汁浸切炒

大腹皮

剉

甘草

炙

草薺

剉

訶梨

白朮

剉

白朮

各一兩

郁李仁

去皮

木香

半兩

乾蝎

去土

炒半

人參

白茯苓

去黑皮

芎藭

各一兩

各一兩

右麝搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎

至七分去滓溫服

真白湯 治妊娠腹痛不思飲食

木香

沈香

丁香

各一分

蓬莪茂

煨

芎藭

當歸

切

芍藥

棟實

炒去核

懷香子

炒半兩

甘草

炙一分

益智

去

陳橘皮

湯浸去

焙

右麤搗篩每服二錢水一盞棗一枚煎至六分去滓

食前溫服

炒薑丸

治妊娠兩脇脹悶腹中疼痛嘔逆不思飲食

乾薑

炮

桂

去麝皮

木香

沈香

當歸

切焙

甘草

炙白

荳蔻

去皮

白茯苓

去黑皮

青橘

湯浸去白焙各半兩

芍藥

剉一兩

乾

木瓜

薑黃

各半兩

右搗羅為末湯浸蒸餅為丸如小彈子大每服一九

細嚼溫酒下食前服

厚朴散

治妊娠冷氣攻心腹疼痛或不納飲食

厚朴

二兩去麝皮塗生薑汁炙令香熟

乾薑

半兩炮裂炒

吳茱萸

一分湯

浸洗七遍

阿膠

三分搗碎炒令黃燥

陳橘皮

一兩湯浸去白瓢焙

訶梨

勒煨用皮

草苳苳

去皮各一兩

白朮

芎藭

人參

去蘆頭各

三分甘草

一分炙微赤剉

右為麤散每服三錢以水一中盞半入生薑三片大棗三枚同煎至一盞去滓不計時候稍熱服之日三夜三一方加當歸無生薑食前服

木香散 治妊娠心腹疼痛

木香

枳殼

去穢炒

白芷

蓬莪茂

煨剉

白朮

炒

益智

去皮炒

甘草

炙各二兩桂去粗皮半兩

青橘皮

湯浸去白穢焙

人參

京三稜

煨剉各一兩

右為末每服二錢不拘時候沸湯調服

半夏散 治妊娠傷冷心腹痛或痰飲不納飲食

半夏

湯浸去滑

人參

去蘆頭

草薢

去皮

白朮

高良薑

剉

艾葉

微炒各半兩

阿膠

搗碎炒令黃燥

陳橘皮

湯浸去穰白焙

厚朴

去粗

皮塗生薑汁炙令香熟各一兩

芎藭

三分

甘草

一分炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

地黃飲 治妊娠心腹痛悶喘無力

生地黃焙 人參 當歸切 桑寄生 芍藥 赤茯苓

苓

去黑皮

桔梗

剉炒各一兩

桂梗

去粗皮

鈎藤

剉

甘草

炙剉各半

兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服日三服

木香和脾飲 治妊娠心腹冷痛霍亂吐瀉

木香 丁香 白朮 甘草炙 芎藭 人參 草

荳蔻

沈香

大腹皮

剉訶梨勒

煨去皮各半兩

右搗篩每服一錢水一盞生薑五片同煎七分去滓

溫服空心食前

枳實湯

一名櫛榔散出聖惠方

治妊娠心痛脇滿不思飲食

枳實

去穰麩炒

人參

赤茯苓

去皮各剉

柴胡

去苗

木香

炮

桂

去粗皮

草荳蔻

去皮各一兩

白朮

三錢分

櫛榔

生剉一兩

右藥粗搗篩每服二錢水一盞煎取七分去滓溫服

不拘時一方用生薑煎服

如聖散 治妊娠心痛胸膈不利不思飲食

人參

白朮

各一兩

乾薑

丁香

炒各半兩

縮砂仁

炒檀

香

桔梗

炒各一兩

胡椒

炒一分

甘草

炙一兩

右搗羅為丸每服二錢鹽湯服

草薺散

出聖惠方

治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不

和

草薺

橘皮

乾地黄

白朮

各一兩

川芎

三分當

歸

炒桂心

乾薑

木香

各半兩

右為細末每服四錢水一盞棗二枚煎至六分熱服

阿膠湯 治妊娠心腹痛胎動不安四肢皆不和

阿膠

炙燥

芎藭

桑寄生

陳橘皮

焙各一兩

艾葉

炒半兩

枳實

去穢麤炒半兩

當歸

切焙三分

高良薑

甘草

炙各一分

右搗篩每服三錢以水一盞入棗三枚煎至七分去

滓不拘時稍熱服

大腹湯

一名雞蘇散出聖惠方

治妊娠心痛脹滿胎不安穩

大腹皮

剉

芎藭

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白

人參

各三分
當歸

苧麻根

剉半兩

紫蘇葉

一兩碎作雞蘇

右篩搗每服五錢水一盞半煎至一盞去滓無時溫

服一方加生薑

厚朴湯 治妊娠心脾痛嘔逆不下食

厚朴

去皮切生薑汁拌

白朮

各四兩

白芷

一兩

乾薑

炮

甘草

炙

益智

炒去皮

陳橘皮

去白切炒

縮砂

炒去皮各二兩

右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

人參飲 治妊娠心痛腹脹滿不思飲食嘔逆不止

人參 桑寄生 阿膠炙 陳橘皮去白炒 縮砂炒去各

二兩 白朮 甘草炙 厚朴去皮生薑汁炙三分

右粗搗為末每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候

丁香散 治妊娠腹中冷瘕

丁香三分 當歸切焙 蓬莪茂煨 益智去皮 甘草炙 芎藭

木香各一分 青橘皮湯浸去白焙半兩

右為細末每服二錢沸湯調下食前服

當歸散

出聖惠方

治妊娠不安胎動腹內疼痛

當歸

三兩到微炒

阿膠

搗碎炒令黃燥

熟地黄

艾葉

微炒各三兩

甘草

炙微赤到

乾薑

炮裂剉各半兩

白芍藥

芎藭

各一兩

右搗篩為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六

分去滓不拘時候稍熱服

芎歸湯

出聖惠方

治妊娠先患冷氣忽腹中痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

吳茱萸

苦梗

亦作桔梗

當歸

各三
厚朴 芍藥
各三兩

右㕮咀以水九升煮三升分三服氣下即安一方有

甘草二兩炙 上證枳殼散亦可

人參湯

出聖惠方

治妊娠心腹俱痛引脇肋煩悶不思飲

食

人參

厚朴

去粗皮生薑汁炙

訶梨勒

阿膠

炙令燥

赤苓

去黑皮各一兩

白朮

陳橘皮

湯浸去白焙各三分

甘草

炙一分

右搗篩每服三錢水一盞入薑五片棗三枚煎至八

分去滓溫服不拘時候

沈香湯 治妊娠心痛不可忍者

沈香

剉

厚朴

去皮生薑汁炙各一兩

附子

炮裂去皮臍尖

甘草

炙各半兩

白朮

芎藭

各二兩

右剉如麻豆每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至六分去滓溫服

人參湯 治妊娠腹內痛如刀刺

人參

四兩

大腹皮

三枚

檳榔

三枚

枳殼

去穰麩炒

芍藥

各四兩

柴

胡

去苗三分

附子

炮裂去皮三分

右剉如麻豆每服三錢水一盞半生薑三片煎至八

分去滓空心食前溫服

白朮湯

治妊娠腹痛疔刺安胎

白朮

剉麩炒四兩

桂

去粗皮二兩

橘皮

湯浸去白焙二兩半

甘草

炙剉一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙二兩

芍藥

芎藭

各一兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至

六分去滓食前熱服

療妊娠三月腹痛時時下血

方見本門漏胎類續斷飲

療妊娠被驚惱胎內不安小腹痛連腰下血

出大方

當歸

川芎

各八分

阿膠

炙

人參

各六分

艾葉

四兩

大棗

三枚

茯苓

一錢

右細切以水四升煮取三升溫分三服

艾葉湯

出聖惠方

治妊娠胎動不安腹內疝痛

艾葉

嫩葉

芎藭

乾薑

炮

桑寄生

各三分

阿膠

搗碎炒

令黃燥

當歸

剉微炒

甘草

炙微赤

剉半兩

右搗篩為末每服三錢以水一盞入生薑片一分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

參朮湯 治妊娠腹痛脇肋脹滿煩躁

人參 白朮

枳殼

去穢炒

赤茯苓

去黑皮各一兩

檳榔

肉苳蔻 柴胡

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓食前服

當歸湯 治妊娠心腹氣攻疼痛

當歸

焙切

麥門冬

焙去心

芎藭

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙各

一兩大蘇

去根

柴胡

去苗各

三兩

右為粗末每服三錢水一盞入生薑五片棗三枚煎至八分去滓不計時候稍熱服

大腹皮飲 治妊娠疼痛及兩脇煩悶嘔逆惡心不止
飲食不下體倦四肢少力或時發氣脹喘息粗大胎
不安穩宜服

大腹皮

剉五分

人參

赤茯苓

去黑皮

當歸

焙切

枳殼

去穢麩炒柴胡去苗白朮各一兩半炒

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七

分去滓溫服日三服

金異湯 治妊娠心痛溫中調氣

粟米 半夏生薑浸五宿切焙各二兩甘草 人參半兩白朮

桂去粗皮檳榔剉四枝各一兩

右搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓

溫服

荳蔻湯 治妊娠心痛時多痰逆食飲無味腹脇脹滿

肉荳蔻

二煨附子

去皮臍切鹽湯浸炮乾燥

縮砂

炒去皮各二兩

木香

白朮

芎藭

各一兩

右剉如麻豆每服二錢水一盞生薑三片煎七分去

滓溫服不拘時

當歸芍藥散

出和劑方

治妊娠腹中絞痛及療產後血暈

氣虛崩中久痢常服通暢血脉不生癰節消痰養胃

明目益津宜服 安期先生賜李少君久餌之藥後

仲景增減為婦人懷胎妊娠痛方

白芍藥

兩半

當歸

茯苓

白朮

兩灸二

澤瀉

川芎

各四兩一方
川芎灸兩半

右為末每服二錢食前溫酒調又補勞傷真氣退邪
熱潤澤容色散邪寒瘟疫瘴時氣一方用芍藥四兩澤
瀉茯苓川芎各一兩當歸白朮各二兩亦可以蜜丸
服

沈香散 治妊娠內積冷氣腹中疴痛

沈香

剉半兩

蜀椒

去閉口及目炒出汗一分

甘草

炙

烏藥

剉

當歸

切芎藭

各一兩

右為末每服一錢溫酒調下熱湯亦得不拘時服

安胎飲

出便產須知

治胎寒腹痛胎熱多驚舉重腰痛腹

滿脹急或動胎或有所下飲食毒物或感時疾往來

寒熱治傷胎臟

當歸

去蘆枳殼

去穰剉炒

粉草

炙

糯米

二合

熟地黃

湯熱

洗淨蒸

川芎

一兩半

右剉每服四錢水一盞半生薑五片棗三枚金銀少
許同煎至七分去滓食前服虛弱者加黃耆下血者
加阿膠炒下血未止者加熟艾復腹痛者加白芷白
芍藥減食者加人參白朮

人參湯 治妊娠疼痛

人參去蘆 茯苓 赤芍藥 桔梗 製朴 甘草

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服

白朮散

出聖惠方

治妊娠胎動腹痛及腰疼不止

白朮 白茯苓 熟地黄 阿膠 當歸 甘草

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時候熱服

桔梗丸 治妊娠心腹疼痛不思飲食夫妊娠心腹痛者由妊娠失於調護外受風冷客於手少陰足太陽心脾之經也脾之經從胃別上膈注心中是也心脾之二經為風冷宿寒所攻邪正交擊故令心腹俱痛久不瘥則妨飲食耗弱氣血傷動胎絡

桔梗一兩訶梨勒煨去核木香各半兩厚朴去粗皮生薑汁炙白

朮各二兩細辛去黃葉半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲下
食前服

芍藥散 治妊娠心腹痛

芍藥一兩白朮一兩黃芩去黑心陳橘皮湯浸去白炒各一兩

木香三分丁香半兩

右為細散每服二錢炒空心生薑湯下

鷄蘇飲 治妊娠氣疔痛疼胎不安

鷄蘇 人參 赤茯苓去黑皮 大腹皮 芎藭各半兩

苧麻根一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片煎至七分滓溫服之

治妊娠心下急氣滿切痛

出大全良方

赤茯苓六分 桑白皮五分 前胡四分 郁李仁 檳榔各三分

右為散末以水一盞煮取一半去滓夜臥服

橘皮湯 治妊娠痛不思飲食

陳橘皮

甘草

剉炒
二兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

白朮

各四兩

草

荳蔻

去皮
二兩

右將葱一握細切拌藥盡一宿炒黃色擣為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

芎藭湯 治妊娠心痛嘔吐不思飲食

芎藭

甘草

炒

芍藥

草荳蔻

檳榔

剉各二兩

右搗篩每服二錢水一盞棗二枚生薑三片煎至七

八分去滓溫服不拘時

鹿角膠散

出聖惠方

治妊娠胎動腹痛悶

鹿角膠

持碎炒令黃燥

人參

去蘆

甘草

炙微赤剉各半兩

芎藭

一兩

當歸

剉微炒三分

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入葱白七寸煎

至六分去滓不計時候溫服

治妊娠胎動腹痛心煩

出聖惠方

芎藭

當歸

剉微炒

阿膠

搗碎炒金黃

曲頭棘鍼

各半兩

大

麥葉

一把

右細剉和均以水一大盞半煎至一盞去滓食前分

三服

治妊娠猝心痛氣欲絕

出便產
須知

川芎藭

當歸

茯苓

厚朴

製各
等分

右水六升煎取二升分為二服立愈

薑茂湯

治妊娠腹痛和氣思食治中滿

薑黃

蓬莪茂

藿香葉

各一兩

甘草

炙半兩

右搗篩每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

加減四物湯 治姙娠產前腹痛及治月事或多或少或前或後氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下

當歸

兩一

川芎

兩一

白芍藥

兩一

熟地黄

兩一

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分取六分青汁熱服日四以知為度姙娠下血即入艾六七葉阿膠

水一盞同煎疾勢甚大散藥不及以味各半兩細剉
以水四盞煎至二盞半去滓分四服食前熱服一日
之中令盡以愈為度平常產乳服至三臘止如虛弱
血臟不調至一月止 因虛致熱熱與血搏口舌乾
渴欲飲水者加枯薑根一兩麥門冬三分 腹中刺
痛熱生風加川芎一分柴胡半兩 身熱脉躁頭昏
項強加柴胡黃芩各半兩 大便秘澀加大黃半兩
桃仁一分炒 大便滑加熟附子一分 發寒加乾

薑牡丹皮芍藥各一分 嘔者加白朮人參各半兩
腹脹加厚朴枳實各一分 虛煩不得服加竹葉人
參各一分 煩躁大渴加知母石膏各半兩 水停
心下為吐加猪苓茯苓皮各一分 虛寒似傷寒類
加人參柴胡防風熟地黄各一兩 此法大治產前
產後衆疾如神加防風熟地黄各一兩 治男子婦
人諸般風毒瘡加地骨皮二兩白茯苓一兩 治男
子婦人骨蒸氣此方乃善養守元氣得之稍巢先生

大有神效 高貴道云患風疾及渾身燥癢以四物
湯清汁調消風散甚妙 產前漏胎加艾阿膠糯米
煎性熱加荊芥煎服即愈 治婦人慾念不遂心膈
迷悶刺痛每服一帖加橘皮香附子玄胡索各半兩
煎 治經候不通腹中疴痛或脚氣衝心加琥珀煎
見效並醋一合煎治立效 治婦人血旺脚痛加五
加皮煎服 治婦人血熱生瘡加地骨皮香附子煎
服 治婦人經候不通口乾頭暈血熱加菊花煎服

立效 治婦人百病吳興通同端仁云加吳茱萸若
陽臟少使陰臟多使有驗 治婦人臂疼又加癰瘰
是血証加紅花煎服效

芎藭散 治妊娠腹疼脹悶

芎藭 當歸 切焙各一兩 乾薑 炮五錢 陳橘皮 湯浸去白焙

右為散每服二錢用糯米飲調下不拘時

地黃湯

出聖惠方

治妊娠心痛煩悶脹

生地黃

焙

淡竹葉

剉各桂一兩半去粗皮

右搗篩為散每服三錢水一盞半煎取一盞去滓溫服

草薺散

出大
全方

治妊娠氣臟本虛宿受風冷脾胃久弱

臟腑虛滑腹臍疔痛日夜無度

厚朴

去粗皮薑汁
浸炒黃二兩

肉苳蔻

一箇
麵煨

草苳蔻

一箇
煨

右咬咀每服三錢薑三片煎至七分去滓執服

香朮散

出大
全良方

治妊娠五月已後常胸腹間氣刺滿

痛腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失

節之所致

廣中莪朮

一兩煨

丁香

炒半兩

粉草

一分

右為細末空心鹽酒湯點服一大盞覺胸中如有物之狀蔡元度寵人有子夫人怒欲去之病醫官王師復用此方三服而愈後果有驗

當歸湯

治妊娠心腹疼痛

當歸

切焙一兩

甘草

炙剉一兩

乾薑

炮半兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞入棗二枚煎至七分

去滓

白朮湯

出千金方

治妊娠心腹疼痛不能食及偏身痛或

衝心痛欲死緣胎有水致痛

白朮

黃芩

去皮各一兩

芍藥

二兩

右為搗篩每服三錢以水八盞煎至五盞去滓分五服服之令易生月飲一劑為善忌桃李雀肉

治妊娠卒心痛死不可忍者

橘皮

三兩

豆豉

三兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下二十粒無時服

黑神散 治妊娠內受寒冷腹中疴痛安和胎氣

杉木節半箇燒灰乾薑一兩炮存性

右搗篩為散溫酒調下一大錢不拘時

枳殼丸 治妊娠腹痛一切氣疾

枳殼二兩漿水浸一日去穰煮令爛研作糊

右將木香搗羅為末入枳殼糊內和丸如梧桐子大

每服三十丸溫酒下不拘時

芎藭湯

治妊娠敗痛不可過安胎止痛

方見安胎類

槐子丸

一名蒲黃丸

治妊娠月數未足而欲似產腹痛者

宜服

方見墮胎後衣不出類

當歸飲

出便產須知

治妊娠腹痛或是冷痛或是胎動

方見

諸血類

治妊娠三五月忽心絞痛

大棗

四箇燒令赤

鹽

一錢燒令赤

右為末取一撮許酒調服之即愈

生雞子酒

出千金方

治妊娠心痛或八九月墮或牛馬驚

傷得心痛者

用破雞子一枚酒和服之

又方

出千金方

用蜜一升和井底泥下

治妊娠卒心痛欲死不可忍者

出聖惠方

用大麻子三升研水八升煮取五升分為五服

玄胡索散

出仁存方

治雙目心腹痛不可忍者及腿痛

用玄胡二兩肥者為末每服三錢以溫酒下食前
又加地黃末一兩急服五錢服效雷公炮製論云
心痛欲死急覓延胡

竹茹湯

出千金方

治妊娠心痛因落胎或倒地胎有傷宜
服

用青竹茹剉碎三兩粗搗篩或每服三錢水一大
盞煎至七分去滓溫服不拘時一方或八九箇月

墜傷或牛馬驚傷得心痛者以青竹皮不拘多少

酒浸三兩沸服之不瘥再服

牛屎方

治妊娠心痛

方見腰痛類

地黃酒

出千金方

治妊娠腹中痛

方見諸血類

治妊娠胎動腹痛連腰

出聖惠方

用好豉一合以水一大盞煎至六分去滓食前分

服二溫服

車脂方

出聖惠方

治妊娠腹痛咳嗽并難產三日不出

方見

類咳嗽

又方

出千金方

取蜜一升頓服良

知母丸

治妊娠月未足似欲產腹中痛

方見安胎類

治妊娠傷胎結血心腹痛

出千金方

取小兒尿二升頓服之瘥

治妊娠四五月忽心腹絞痛及冷氣攻注心脾

出大全良方

用大紅棗一十四枚燒存性為末以童子小便調下

治妊娠胎動腹痛連腰

出聖惠方

右取大麥麴一兩以水一盞煎至五七沸食前分三

溫服 燒車釭脂末內酒中一作車轄中脂

當歸散

出聖惠方

治妊娠胎動不安腹痛不止

當歸

三續斷

芎藭

陳橘皮

浸洗去白穰
燒各一兩

右搗篩為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠心痛或八九月墜樹或牛馬驚傷得心痛及煩

悶

出聖惠方

白蜜

三兩

羊脂

八兩

青竹茹一升

右合煎食頃服如棗核大三枚日三一水煎服

大龍散

出濟生拔粹

治妊娠心氣痛

艾葉

鹽炒半兩

茴香

炒

川楝子

各半兩炒

治妊娠渾身氣痛衝心欲死方

出楊子建萬全護會方

吳茱萸

白朮

當歸

防風

芎藭

續斷

灸艾葉

各半兩

藿香

一分

右杵羅為末每服三錢水一盞一分煎取一盞空心

服可連進兩三蓋以效為度

治妊娠忽然心痛悶絕欲死不可勝忍

出萬全護會方

桑寄生 當歸 茯苓 防風 芍藥 吳茱萸

右細杵羅為末每服二錢以水一盞煎取九分溫喫

治妊娠心痛煩悶

用麻子一合研細水一盞煎取六分去滓非時溫服

麻子乃今人布種麻子

中惡心腹痛 附論

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡之氣暴中於胎也所以然者血氣自養而為精之主若血氣不和則精神虛弱故邪毒之氣得以中之妊娠之人亦足損胎也

方

當歸散

出聖惠方

治妊娠中惡心腹疼痛

當歸

剉微炒

丁香

亦作雞舌香

川芎

各三兩

青橘皮

二兩

吳茱

萸

半兩去梗湯泡三次炒黑

右為細末無時溫酒調一錢

犀角散

出聖惠方

治妊娠中惡腹痛心悶

犀角梢

一兩

川升麻

木香

各三分

右搗篩為散每服三錢以一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

治妊娠中惡心腹疼痛

出聖惠方

地黃

一兩

枳殼

麩炒令黃去穢

木香

各三分

右為細末每服一錢酒調下不計時候

又方

出聖惠方

桔梗

一兩細切畧炒生薑半兩

又良薑湯

出聖惠方

高良薑

蓬莪茂

各一兩

右為細末不拘時候溫酒調下一錢

檳榔散

治妊娠中惡心腹疼痛

右咬咀以水煎服無時

又方

出聖惠方

金匱要略卷三十八
吳茱萸

半兩湯浸十當歸一兩剉
通晒乾微炒

右為末不拘時候醋湯調下一錢

治妊娠中惡腹痛

出千金方

用新生雞子二枚破著杯中以糯米分和如粥頓服

亦治妊娠胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血

不止

又方

出千金方

用水三升洗夫靴剔汁溫服

治妊娠中蠱心腹痛

出千金方

用燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼蠱主姓名

心腹脹滿

附論

夫妊娠心腹脹滿者由腹內宿有寒氣致令停飲妊娠重因觸冷飲食發動與氣相干故令心腹脹也妊娠脾氣不和痰飲留滯則中焦生寒寒則胃水滯不能消化令人胃脹胃脹者腹滿也

方

丁香散 治妊娠腹滿脹急不進飲食利心胸止乾嘔

丁香

一分

白朮

蒼朮

各一分

前胡

去蘆頭

胡椒

高良

薑

炮

葛根

厚朴

去粗皮生薑汁炙各半兩

藿香

訶梨勒

去核

旋復花

各一兩

甘草

炙二兩

右搗羅為散每服二錢匕沸湯點取服不計時候

阿魏丸

治妊娠腹滿喘逆腹悶

阿魏

麵裹煨熟細研

丁香

木香

懷香子

微炒

白芷

陳

橘皮

湯浸去白焙

檳榔

剉

香附子

炒各一分

甘草

炙

生薑

去皮

薄切炮乾
各半兩

右搗篩為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸爛嚼前蘇
藹湯下溫服酒鹽湯生薑湯下亦得此藥下氣療心
腹虛脹

厚朴散 治妊娘腹脹不飲食

厚朴 去粗皮生薑汁炙 白朮 芎藭 乾薑 炮 當歸 切 訶

梨勒 煨去核 陳橘皮 湯泡去白 各一兩 人參 芍藥 各半 甘

草 炙一分

右篩末每服三錢水一盞棗二枚煎取七分去滓不

計時候服

白苳蔻散

出聖惠方

治妊娠心腹脹滿氣攻胸膈咽喉不

利飲食減少

白苳蔻

去皮

甘草

炙微剉

枳殼

麩炒

微黃去

人參

去蘆頭

白朮

大腹皮

剉三分

前胡

去蘆頭

赤茯苓

訶梨勒

煨用皮

陳皮

湯泡去穢焙各一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

倉公下氣湯

出大全良方

治妊娠心腹脹滿兩脇煩悶不

下飲食四肢無力

羌活 赤芍藥 甘草 檳榔 青皮 大腹皮

陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮 桂心

各半兩

紫蘇莖

二兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服無時候一方加燈心煎

訶梨勒散

出聖惠方

治妊娠腹滿氣衝胸膈煩悶四肢少

力不思飲食

訶梨勒

赤茯苓

去黑皮

前胡

大腹皮

陳橘皮

桑根白皮

枳殼

白朮

芎藭

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分切棗三枚同煎取七分去滓不計時候溫服

檳榔散

出聖惠方

治妊娠心腹脹滿兩肋妨悶不下飲食

四肢少力

檳榔

前胡

去蘆頭

白朮

芎藭

各半兩

陳橘皮

湯浸去白

穰枳殼

麩炒黃去穰各三分

甘草

炙微赤剉三分

右搗篩為末每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前溫服

人參湯 治妊婦腹滿兩脇妨悶不思飲食

白朮

三兩

陳橘皮

湯浸去白皮焙一兩

木香

半兩

丁香

半兩

厚朴

去粗

皮生薑汁炙二兩

半夏

一兩生薑汁浸一宿切焙乾

乾薑

甘草

一兩

右為末每服三錢水二盞入生薑五片煎至一盞去

滓溫服不拘時

沈香散 治妊娠腹滿不思飲食

沉香

劉

陳橘皮

湯浸去白皮

人參

各半兩

茯苓

去黑皮

甘草

炙各一兩

白朮

二兩

木香

右細末每服二錢入鹽少許以沸湯點食前服

白芷薤丸

治妊娠腹滿飲食遲化寬中容氣健脾和

胃

白芷薤

去皮二兩

枳殼

用漿水炙令軟去穢焙乾半兩

木香

二兩

當歸

焙切

二阿梨勒去穰二兩一兩生一兩熟陳橘皮

右為末將棗用水煮去皮核爛研和藥丸梧桐子大
每服二十丸切生薑入鹽炒焦黑色煎湯下不拘時
木香丸 治妊娠腹滿不思飲食嘔逆不止

木香 莎草根炒去毛蓬莪茂炮剉青橘皮 甘松各一

兩甘草炙半兩

右為末水浸炊餅丸如彈子大每服一丸用紙煨生
薑一片如皂子大與藥同嚼溫湯食前服下

草薺薊散

出聖惠方

治妊娠心腹脹滿脾胃氣虛不下飲

食

草薺薊

去皮人參

去蘆白朮

各一兩

柴胡

去苗

陳橘皮

湯浸

去穢

白焙各一兩半

甘草

炙微赤剉半兩

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時候稍熱服

藿香丸

治妊娠腹滿溫胃氣化冷痰利胸膈思飲食

藿香葉

木香

各一兩

肉苳薊

丁香

各半兩

半夏

一兩

生薑汁浸
三宿切焙

右為末生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十

丸生薑湯下

白朮散

出聖惠方

治妊娠心腹脹滿不欲食

白朮

黃芩

陳橘皮

二兩湯浸去白穰焙

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

一枚煎至六分去滓不計時候溫服

枳殼湯

出得集方

治婦人胎腹脹

枳殼

三兩黃芩一兩

右為粗末每服半兩水一盞半煎至一盞去滓溫服

治產前脹滿身體沉重枳殼湯中加白朮一兩

治妊娠脹滿有熱証者

出胎產救急方見本門諸血類枳殼湯

身體腫脹

附論

夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜腳腫俗呼為皺腳亦有

通身腫滿心腹急脹名曰胎水 凡妊娠之人無使氣
極若心靜氣和則胎氣安穩若風中寒邪及有所觸犯
則隨邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若或虛腫
乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣
弱則肌肉虛浮水氣流溢故令身體腫滿也然其由有
自或因泄瀉下痢臟腑虛消耗脾胃或因寒熱瘧疾
煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭目或手足浮腫也
然水積於胞兒未成形則胎多損壞及其胎產日脚微

腫乃胞臟水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒冷因所觸故令腹脹腫滿也 妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以下行步艱辛漸至喘悶飲食不美似水氣壯至於脚指間有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任二經有血風未可妄投湯藥亦恐大誤甚者慮將生之際費力有不測之憂故不可不治於未產之前也 脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自消化無有停積若妊娠

脾胃氣虛經血壅閉則水飲不化濕氣陰溢外攻形體
內注胞胎懷妊妊娠腫滿或傷胎氣如臨月而脚微腫者
利其小便則病可愈

方

木通湯

出聖
惠方

治妊娠身體浮腫心腹脹滿小便不通

木通

劉

香薷

桑根白皮

劉各
一兩

木香

訶梨勒皮

黃芩

各三
兩

枳殼

去穢
麩炒

檳榔

各半
兩

紫蘇莖葉

半
兩

右粗搗篩每服四錢水一盞入生薑半分拍碎煎至

六分去滓溫服食前日再

當歸散

出大全良方

治胎前諸疾或因怒中氣沖子臟或

沖脰脉腹急肚脹腰腹時疼不思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀玉門忽腫

當歸

一兩

赤茯苓

枳殼

白芍藥

川芎

各二兩

川

白薑

炮

木香

煨

粉草

各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓無時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣

實及北人於內加二分服服之或連日大便閉澀加蜜同煎

八正散

出危氏方

治妊娠心氣壅胎氣八個月散墜手足

浮腫急痛不安難產

瞿麥

剉

木通

剉去皮節

滑石

大黃

剉切麩裏煨焙

車前子

右剉散服三錢水一盞茴香撮同煎熟服

勝金散

出濟生方

小腹虛脹者何蓋飲食硬物傷胎胎既

受病傳於脾胃氣虛冷通小腹狀若奔豚或腰重大

便閉澀兩脇虛鳴宜服勝金散和中下氣疾即安矣

吳茱萸

去枝梗酒浸炒

陳皮

去白

乾薑

川芎

各一錢半

厚朴

去皮

薑甘草

炙

縮砂仁

炒各三錢

右為細末每服二錢鹽湯調下不拘時候一方有木

香無縮砂仁

桑白皮湯

出聖惠方

治妊娠四肢腫滿小便不利喘促

桑白皮

剉一兩

枳實

去穰炒

商陸

各半兩

澤瀉

三分

冬葵根

赤茯苓

去黑皮

木香

剉各一兩

右粗搗篩每服四錢以水一盞半入生薑半分拍碎煎至八分去滓食前溫服以利為度

鯉魚湯

出大全良方

治妊娠腹大胎間有水氣腳腫通身

腫滿胸肚不分

鯉魚

一尾二斤

生薑

用五兩

芍藥

當歸

各二兩

白朮

五兩

苓

四兩

右呖咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升內藥煎取三升分五服忌桃李雀肉鮓物等一方用陳皮

少許同煎昔有妊娠腹脹小便不利吐逆諸醫雜進
溫脾胃寬氣去脹等劑服之反致藥物不納轉加脹
滿捶心驗之胎死腹中又服諸下胎藥不能通舉家
憂惶因得鯉魚湯論曰脚腫俗呼為鰓脚亦有通身
腫滿心胸急脹名曰胎水証遂去心前衣服視之胸
肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消
脹去方得分娩死胎可謂更生之人矣此証蓋緣懷
身腹大娠不自知覺人人皆以謂身娠如此終不以

為胎水病醫人何以得知故書此諭病家自當覺察也

防已湯

出聖惠方

治妊娠通身浮腫喘息促小便澀

防已

大腹皮

剉各三分

桑根白皮

剉

紫蘇莖葉

赤

茯苓

去黑皮各一兩

木香

一分

右粗搗篩每服四錢水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓食前溫服一方無大腹皮

赤茯苓湯

出聖惠方

治妊娠身體浮腫心腹急滿小便赤

澁及水腫

赤茯苓

去黑皮一兩

白朮

旋復花

各半兩

木通

杏仁

湯浸去皮尖一兩

黃芩

炙三分

右粗搗每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓食前溫服一方無木通用防已二兩不用

薑煎

茯苓丸

出聖惠方

治妊娠身體腫有水氣心腹脹滿小便

澁喘息促

赤茯苓

去黑皮一兩

郁李仁

湯浸去皮研半兩

檳榔

剉半兩

葶藶

子

炒令黃研三分

枳殼

去穰麩炒半兩

白朮

炒三分

右搗羅四味為末入二味同研令細煉蜜丸如梧桐

子大每服二十九煎桑白皮湯下一方加桑白皮名

檳榔丸粥飲下

天仙藤散

出十便良方

治妊娠足腫似水氣狀

天仙藤

洗畧炒

香附子

炒陳皮

甘草

烏藥

不須要天

台者但得香而辣者良

右等分淨秤為細末每服三錢水一盞薑三片木瓜三片紫蘇三葉同煎至七分放溫澄清食前服日三服小便利氣脉通體輕腫漸消更不須多服

療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

出大全良方

茯苓

四兩

杏仁

檳榔

各三兩

旋復花

郁李仁

各一兩

右為粗末以水六升煮取三升去滓溫分三服小便

通即止

葶藶散

出大全良方

療妊娠遍身紅腫

葶藶子

十分

白朮

二錢

茯苓

二兩

桑白皮

二兩

郁李仁

八分

右為粗末以水六升取二升分溫服小便利即瘥

澤瀉湯

出大全良方

治妊娠經氣壅滯身體浮腫喘促大

便難小便澀

澤瀉

桑根白皮

剉

木通

枳殼

去穢炒

赤茯苓

去黑

皮
檳榔

剉各二兩

右搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑半分拍碎煎至八分去滓食前溫服稍利為度日再服

腎著湯

出三因方

治妊娠脚腫痛

茯苓

白朮

各四兩

乾薑

甘草

杏仁

三兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分食前服

五皮散

出大全良方

治胎水亦治尋常脾虛腫滿

大腹皮

桑白皮

生薑皮

茯苓皮

橘皮

等各

分

右㕮咀每服半兩水二盞濃磨木香一呷同煎至八

分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿一方無桑白

皮有白朮倍之名白朮散

治妊娠體腫有水氣心腹急滿

出千金方

茯苓

白朮

各四兩一分無白朮

黃芩

杏仁

各二兩

旋復花

二兩

右咬咀以水六升煮取二升半三服忌桃仁雀肉鮓物

寄生飲 治妊娠遍身虛腫

桑寄生

一兩

桑根白皮

剉炒三分

木香

半兩

大腹皮

二分

紫

蘇莖葉

一兩

右細剉如麻豆大拌勻每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服

桑白皮飲

出聖惠方

治妊娠四肢腫皮肉拘急小便不利

桑根白皮

剉炒一兩

商陸根

一兩半

赤小豆

三合

羌活

去蘆頭半

兩

右㕮咀如小豆大拌勻用水五盞入生薑七片同煮候豆熟瀝去滓渴即飲汁並食豆小便利瘥一方無

生薑名商陸湯

猪苓散

出聖
惠方

治妊娠身體浮腫腹脹小便不利渴引

飲氣急

猪苓

二兩去
黑皮

紫蘇莖葉

木通

右搗細羅為散每服飲食以溫水調下二錢

葵子散

出聖
惠方

治妊娠身體浮腫小便不利洒淅惡寒

葵子

赤茯苓

漢防已

各一
兩

右搗羅為散每於食前以粥飲調下一錢

商陸赤小豆湯

一名赤小豆湯出危氏方

治妊娠手足浮腫攣足

赤小豆

商陸

各等分

右咬咀每服一兩水一碗煎至七分澄清汁服一方

澤瀉一方無澤瀉一方有澤瀉桑白皮

治妊娠從脚上至腹腫小便澀渴引飲

出鮑氏方

取猪苓五兩為末以熟水服方寸七日三服

燒枰錘方

出肘後方

治妊娠脹滿及妊娠卒下血

方見諸血類

治妊娠毒腫方

出千金方

用蕪菁根淨洗去皮搗酢和如薄泥勿令有汁猛火煮三四沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒時溫服無根即用子若腫在咽中取汁含咽之

又方

出千金方

用燒犍牛屎鮓和傅之乾則易亦可服方寸七日三治姪婦兩脚浮腫名曰脆脚因脾衰不能制水血化為水所致

用生料平胃散每服三錢薑煎服紫蘇湯服亦可

治婦人身腫九月而瘖啞不能言者

煎玉燭散二兩水半碗煎至七分去滓入蜜放溫時
時呷之

腰痛附論

夫腎主腰足因勞傷動其經虛冷乘之則腰痛冷氣乘
虛入腹則腹痛故令腹腰相引而痛其痛不止多動胎
氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也

方

五加皮散

出聖惠方

治妊娠腰疼痛不可忍或連膝痛先

服此散

杜仲

四兩

五加皮

二兩

阿膠

炙

防風

金毛狗脊

川

芎

北細辛

白芍藥

各二兩

杏仁

八十枚去皮炒

草薢

三兩

右㕮咀以水九升煮取二升去滓下阿膠作三服一

方無芍藥生薑煎服

續斷丸

一名五加皮丸出聖惠方

療妊娠二月三月腰痛不可忍

者次服此丸

續斷

杜仲

各十分

芎藭

獨活

各三兩

狗脊

五加

皮

革薢

芍藥

薯蕷

訶子肉

各八兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下四十九日

服三

平胃散

一名平安散

治產前氣築刺兩脇疼痛

方見咳嗽喘息類

杜仲散

出聖惠方

療觸動胎不安以致腰痛背痛及臍腹

內痛

杜仲

五加皮

當歸

芍藥

川芎

革薢

各三

兩人參一兩半

右細剉以水七升煮取二升半分溫三服無時

防風湯 治妊娠身痛

防風去蘆炒 藁本去蘆 獨活去蘆 細辛去葉 甘草 阿膠

炒令燥

右㕮咀每服三錢水一盞煎熱服之

當歸散

出大全良方

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹

痛二三月娠

當歸

三兩

甘草

各二兩

蔥白

一斤

右細剉以水七升煮取三升去滓分溫五服無時

大地黃丸

治產前後腰腹疼一切血疼及治氣血虛

四肢不舉骨體熱疼

烏梅肉

當歸

各一兩

熟地黃

二兩

右為細末煉蜜如彈子大丸每服一丸白湯嚼下空

心

大腹皮散

治妊娠氣壅攻腰疼不可忍

大腹皮

劉

郁李仁

湯浸去皮
尖微炒

澤瀉

各一兩

右搗篩為散每服四錢水一盞生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

治妊娘腰痛

豉二榆白皮

三兩

右熟搗蜜丸如梧桐子大服二十七丸亦治心痛溫

酒亦可

治妊娘腰痛不止方

鹿角屑

二兩
微炒

生乾地黄

一兩
半

右搗細羅為散每于食前以溫酒調下二錢

治姙娠腰痛

用麻子三升以水五升煮取汁三分五服亦治心痛

牛屎方 治姙娠腰痛亦治心痛煩悶

用燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

地黄酒

治姙娠腰痛

方見諸
血類

紫酒 治姙娠腰痛如折亦治常人腰痛亦名聖酒方

用大黑豆二合炒令香熟以酒一大盞煎取七分去豆空心頓服

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

用破故紙不拘多少瓦上炒令香熟為末嚼核桃肉半箇空心溫酒調下二錢

療妊娠腰痛反覆不得

用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎為度取酒飲之為末服亦可

治妊娠卒腰背痛如折

以銀一兩水三升煎取二升飲之

產前軟勝

甘草

生薑

烏梅

等分
剉碎

右用水一大盞煎至八分去滓服令勝軟產宮氣痛

不攻作

杜仲丸 治衝任脉虛血海虛弱寒濕邪氣客搏胞絡

妊娠腰痛小便牽連行步力弱艱于俯仰小便白濁

晝夜頻併

五加皮

萆薢

山茱萸

二味各三兩

杜仲

四兩炒去絲

阿

膠

粉炒珠子

金毛狗脊

炙去毛

防風

去蘆頭

川芎

細辛

鹿角屑

六味各二兩

當歸

洗焙

生乾地黄

各二兩

右為細末蜜糊丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下或煎艾湯下空心食前服

阿膠丸 治妊娠胎臟受寒腰腹疼痛或因損動惡露

頓下腹痛作陣

香附子

去毛

天仙子

炒令黑

當歸

洗焙各二兩

五味子

吳

茱萸

湯洗七遍各兩半

阿膠

蛤粉炒

川芎

乾薑

炮各一兩

蒼朮

三兩米泔水浸一宿焙乾

右杵為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十

丸煎艾湯下或木香醋湯下空心食前

治妊娠腰痛不可勝舉兩足沈重行步無力臍腹痛不

可忍

杜仲

去粗皮

續斷

茯苓

川芎

防風

芍藥

草薺

當歸

各半兩


枳殼

切取青

細辛

各一分

右細杵羅為末每服三錢水二盞二分同煎取一盞
空心去滓喫蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三
十九亦得



普濟方卷三百三十八